

Die Impfaktionen des mobilen Impfteams des Landkreises Emsland gehen weiter. In Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Dörpen sind folgende Termine geplant:

- 04.07.2022 von 15 – 18 Uhr Heimathaus Dörpen, Finkenstraße
- 11.07.2022 von 15 – 18 Uhr Heimathaus Dörpen, Finkenstraße
- 18.07.2022 von 15 – 18 Uhr Heimathaus Dörpen, Finkenstraße
- 25.07.2022 von 15 – 18 Uhr Heimathaus Dörpen, Finkenstraße

Grundimmunisierung (Erst / Zweitimpfungen)

- bei Personen ab 12 Jahren sind zwei Dosen der mRNA-Impfstoffe Comirnaty (bis 29 Jahre zu bevorzugen) oder Spikevax im Abstand von 3 bzw. 4 Wochen erforderlich (bis zu einem Alter von 15 Jahren immer mit Anwesenheit eines/einer Sorgeberechtigten während der Impfung zusätzlich zur schriftlichen Einwilligung)
- zur Optimierung des Impfschutzes nach einer Impfung mit der Vaccine Janssen von Johnson & Johnson wird bei Erwachsenen im Abstand von 4 Wochen eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff durchgeführt.
- Alternativ zu mRNA-Impfstoffen kann bei Erwachsenen die Grundimmunisierung mit 2 Dosen des Protein-Impfstoffs Nuvaxovid im Abstand von 3 Wochen durchgeführt werden.
- bei Kindern von 5 bis 11 Jahren wird 1 Dosis des mRNA-Impfstoffs Comirnaty (10 µg) für Kinder von der STIKO empfohlen. Die 2. Dosis kann in Abhängigkeit vom weiteren Pandemieverlauf zu einem späteren Zeitpunkt nach Aussprechen einer entsprechenden

Auffrischimpfung (3. Impfung)

- Bei Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind, regelhaft frühestens ab 3 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung (in der Altersgruppe von 12 bis einschl. 15 Jahren ist mit Anwesenheit eines/einer Sorgeberechtigten während der Impfung zusätzlich zur

Auffrischungsimpfung (4. Impfung)

- regelhaft nach STIKO bei Personen ab 70 Jahren, jedoch auch ab 60 Jahren sinnvoll (ab 3 Monate nach der 1. Auffrischungsimpfung). Jüngere können auf ausdrücklichen Wunsch ebenfalls eine 4. Impfung erhalten, wenn die letzte Impfung mindestens 6 Monate zurückliegt.
- Nach STIKO: Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen ab 6 Monate nach der 1. Auffrischungsimpfung.
- Derzeit sind für Personen, bei denen nach der 1. Auffrischungsimpfung eine Covid-19-Infektion aufgetreten ist, keine weitere Auffrischungsimpfung erforderlich.

Vorgehen bei Impfungen mit durchgemachten Covid-19-Infektionen

- In Fällen, bei denen vor oder nach einer Covid-19-Infektion eine Impfung gegen SARS-CoV-2 mit einem Abstand von unter 4 Wochen zwischen Impfung und Covid-19-Infektion durchgeführt wurden, werden beide Ereignisse wie 1 Immunisierung (also wie 1 Impfung o. wie 1 Infektion) gezählt. Der Abstand zwischen Infektion und anschließender Impfung soll im Regelfall 3 Monate betragen.
- Personen, die eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben und danach (Abstand \geq 4 Wochen) schon eine Impfstoffdosis erhalten haben, sollen im Abstand von mind. 3 Monaten nach der vorangegangenen Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten
- Personen, die nach COVID-19-Impfung (unabhängig von der Anzahl der Impfstoffdosen) eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen im Abstand von mind. 3 Monaten nach Infektion eine Auffrischungsimpfung erhalten.

- Kinder von 5 bis 11 Jahren auch ohne Vorerkrankungen, die bereits eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen ab 3 Monate nach der Infektion eine zusätzliche Impfung mit 10 µg Comirnaty für Kinder erhalten.
- Personen ≥12 Jahre, die eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen zur Vervollständigung ihrer Grundimmunisierung bis auf weiteres eine einmalige Comirnaty Dosis für Erwachsene im Abstand von mindestens 3 Monaten zur Infektion erhalten.

Impfstoff

- Im Regelfall erhalten alle Impflinge ab 30 Jahren zur Grundimmunisierung (Erst- und Zweitimpfungen) oder als Auffrischungsimpfung den Impfstoff Spikevax von Moderna. Je nach Verfügbarkeit der beiden Impfstoffe kann u. U. auch Comirnaty von Biontech/Pfizer in dieser Altersgruppe eingesetzt werden.
- Im Regelfall erhalten alle Impflinge unter 30 Jahren sowie Schwangere (ab 2. Trimenon) zur Grundimmunisierung (ab 12. Jahren) oder als Auffrischungsimpfung (ab 12 Jahren) den Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer
- Bei nicht abgeschlossener Grundimmunisierung (nur eine Dosis eines mRNA-Impfstoffes erhalten) wird möglichst der gleiche Impfstoff wie bei der Erstimpfung verwendet.
- Bei Unverträglichkeiten von mRNA-Impfstoffen kann unter entsprechendem Hinweis auf eine fehlende Zulassung durch die EMA und Zustimmung des Impflings auch Nuvaxovid zur Auffrischung nach zuvor erfolgten mRNA-Impfungen verwendet werden